

宣傳冊

切香肠

将应作为一篇论文发表的研究结果“切分”成几篇不同的论文的行为被称为“香肠发表”或者“切香肠”。¹

与重复发表 的在两篇或两篇以上论文中报道完全相同的数据不同，切香肠是将一个大的研究分解或分割成两篇或两篇以上的论文进行发表。 这些切分后的部分被称为研究“片段”。²

通常，若某项研究的多个“片段”含有相同的假设、研究对象和方法，这种做法是不允许的。 相同“片段”的发表次数不应超过一次。³

原因：美国研究诚信办公室认为，“切香肠”可能误导不知情的读者认为每一“香肠片段”（即期刊文章）所含数据来自不同的研究样本，从而导致文献记录的不准确。²此做法不仅影响“科学数据库”的准确性，重复的内容还会浪费读者的时间，以及增加编辑和评审员处理稿件的时间，因为他们对每篇文章都要进行单独评审。 此外，这一行为还不正当地提高了作者文章的总引用次数。 .

在某些情况下，大型临床试验和流行病学研究获取的数据无法同时发表，或者这些研究在不同的研究终点解决不同的问题。 这些情况下，对研究的某些重要结果进行分别描述是允许的。^{1, 4, 5} 但是每篇论文应有明确定义的研究假设，并清楚说明是某一较大研究的部分结果。³

大多数期刊都有以下要求：如果作者知道或怀疑稿件报道的数据是某一研究的一部分，在投稿时应明确说明，同时附上任何发表或未发表的与此文章相关的其它论文。^{2, 5}

如何判断“切香肠”及预防手段*

行为	定义	是否违反出版道德	你该怎么做
分解或切分某一项研究的数据，写成不同的稿件进行发表。	在多篇不同论文中发表研究的小“片段”称为“香肠发表”或“切香肠”	是。 “切香肠”可能误导不知情的读者认为每一“切片”所含数据来自不同的研究样本，从而导致文献记录的不准确。 ²	■ 避免对单项研究的数据进行不恰当的分割，在两篇或两篇以上论文中发表。 • 论文投稿过程应确保透明。 投稿时同时附上与所投稿件密切相关的任何其它稿件的副本。 ■ 包括任何已发表的稿件，近期投递的稿件以及已被接受的稿件。 ⁵

*如有疑问，请咨询你的教授、导师或其他能为你在此方面提供正确指导的权威人士。

参考资料

1. Abraham P (2000年). 重复与“切香肠”发表. Journal of Postgraduate Medicine, 46: 67.
2. 美国研究诚信办公室。 “切香肠”（即数据切分）。 链接 <http://ori.hhs.gov/plagiarism-16>。 访问日期 年 9 月 21 日。
3. 出版道德委员会 (COPE) (2005 年)。 案例：“香肠”发表。 链接: <http://www.publicationethics.org/case/salami-publication>。 访问日期: 2012 年 8 月 26 日
4. Angell M, Relman AS. 重复发表。 N Engl J Med 1989年; 320:1212-1214
5. Kassirer JP, Angell M. 重复发表：敲响警钟。 N Engl J Med 1995年; 333:449-450